

PLOCHER BRAŠKIŲ AUGINIMO TECHNOLOGIJA



| Naudojimas | PLOCHER produktai | Kiekis | Pastabos |
|---------------------------------|--|-----------------------------|---|
| Pavasari dirvos aktyvinimui | plocher humusinga dirva me plocher specialūs lapai me | 1 - 2 l/ha 200 ml/ha | Lauko higiena, paviršinis liekanų kompostavimas, palaipsniui mažinkite pesticidus ir mineralinių trąšų kiekį. |
| Sodinukų apdorojimas | plocher augalams do | 500 g/ha Mirkyti tirpale | Pagerina prigijimą Tirpalo santykis 1 g/1l vandens |
| Pumpurų formavimosi metu | plocher kombi-lapai mg | 400 - 600 g/ha | Palaipsniui mažinkite pesticidus ir mineralinių trąšų kiekį |
| Mezgant uogoms | plocher kombi-lapai mg | 400 - 600 g/ha | Palaipsniui mažinkite pesticidus ir mineralinių trąšų kiekį |
| Dirvos aktyvinimas vasaros gale | plocher humusinga dirva me plocher specialūs lapai me | 1 - 2 l/ha 200 ml/ha | Lauko higiena, paviršinis liekanų kompostavimas / mulčius (šiaudai)/ derliaus likučiai |

Nešiklis:
do - Dolomitas, me - Melasa, mg - Magnio sulfatas.

Priklausomai nuo orų įtakos, vietos ir kt. gali prireikti keisti purškimo seką ir dozę.

Atkreipkite dėmesį į šias rekomendacijas:

- purkštuve naudokite plocher agro-kat xl skirtą vandens struktūros atstatymui ir kietumo stabilizavimui:



- Naudojant PLOCHER auginimo technologiją pirmais metais: iki 20 % sumažinkite mineralinių trąšų ir pesticidų kiekį.
- Nuolat naudojant PLOCHER auginimo technologijas toliau nuosekliai mažinkite mineralinių trąšų ir pesticidų kiekius.

