


PLOCHER: BULVIŲ TECHNOLOGIJA



Augimo tarpsniai BBCH	Po derliaus nuėmimo ir pavasarį	Gumbų apvėlimas	21 - 25 Lapų ir stiebo formavimasis 31 - 39 Augimas į aukštį	41 - 49 Gumbų formavimas 51 - 59 Pumpurų formavimasis	61 - 69 Žydėjimas 70 - 79 Gumbų vystymasis
PLOCHER produktai Rekomendacijos: <i>Purškiamo vandens kiekis: 150 - 400 l</i> <i>Jei purškiate kelių produktų mišinius, visada pirmiausiai į purkštuvą supilkite PLOCHER produktus.</i>	plocher humusinga dirva me <i>(ak 7071)</i> 1,0 l/ha Pirmas naudojimas, kai dirva yra labai blogos kokybės ir suslėgta <i>1,5 - 2 l/ha</i>	plocher augalams do <i>(ap 3051)</i> Arba plocher augalams me <i>(ap 3071)</i> 500 g arba ml/ha	plocher humusinga dirva me <i>(ak 7071)</i> 500 ml/ha plocher augalams do <i>(ap 3051)</i> 100 g/ha plocher specialūs lapai me <i>(ap 3471)</i> 100 ml/ha	plocher augalams do <i>(ap 3051)</i> 100 g/ha plocher specialūs lapai me <i>(ap 3471)</i> 200 ml/ha plocher kombi-lapai mg <i>(ap 3752)</i> 500 g/ha	plocher augalams do <i>(ap 3051)</i> 100 g/ha plocher kombi-lapai mg <i>(ap 3752)</i> 500 g/ha

Atkreipkite dėmesį į šias rekomendacijas:

- purkštuve naudokite plocher agro-kat xl skirtą vandens struktūros atstatymui ir kietumo stabilizavimui:



- Naudojant PLOCHER auginimo technologiją pirmais metais: iki 20 % sumažinkite mineralinių trąšų ir pesticidų kiekį.
- Nuolat naudojant PLOCHER auginimo technologijas toliau nuosekliai mažinkite mineralinių trąšų ir pesticidų kiekius.

