

PLOCHER CUKRINIŲ RUNKELIŲ TECHNOLOGIJA



| Augimo tarpsniai BBCH | Po derliaus nuėmimo ir pavasarį | Sėklų apvėlimas | 12 - 19 lapelių vystymosi stadija | 30 - 40 pagrindinis augimo etapas |
|---|--|--|--|--|
| PLOCHER produktai Rekomendacijos: <i>Purškiamo vandens kiekis: 150 - 400 l</i> <i>Jei purškiate kelių produktų mišinius, visada pirmiausiai į purkštuvą supilkite PLOCHER produktus.</i> | plocher humusinga dirva me (ak 7071) 1,0 l/ha Pirmas naudojimas, kai dirva yra labai blogos kokybės ir suslėgta <i>1,5 - 2 l/ha</i> | plocher augalams do (ap 3051) 20 g sėjos vienetai | plocher humusinga dirva me (ak 7071) 500 ml/ha plocher specialūs lapai me (ap 3471) 100 ml/ha plocher augalams do (ap 3051) 100 g/ha <i>Esant nepalankioms gamtinėms sąlygoms:</i> plocher kombi-lapai mg (ap 3752) 400 - 600 g/ha | plocher kombi-lapai mg (ap 3752) 400 - 600 g/ha plocher specialūs lapai me (ap 3471) 200 ml/ha plocher augalams do (ap 3051) 100 g/ha |

Atkreipkite dėmesį į šias rekomendacijas:

- purkštuve naudokite plocher agro-kat xl skirtą vandens struktūros atstatymui ir kietumo stabilizavimui:



- **Naudojant PLOCHER auginimo technologiją pirmais metais: iki 20 % sumažinkite mineralinių trąšų ir pesticidų kieki.**
- **Nuolat naudojant PLOCHER auginimo technologijas toliau nuosekliai mažinkite mineralinių trąšų ir pesticidų kiekius.**