

PLOCHER

RAPŠŲ TECHNOLOGIJA



Augimo tarpsniai BBCH	Po derliaus nuėmimo	Sėklų apvėlimas	21 – 25 Lapų vystymasis	Anksti pavasarį kai dirvos temperatūra +7° C	51 – 63 Butonizacija
PLOCHER produktai Rekomendacijos: <i>Purškiamo vandens kiekis: 150 - 400 l</i> <i>Jeį purškiate kelių produktų mišinius, visada pirmiausiai į purkštuvą supilkite PLOCHER produktus.</i>	plocher humusinga dirva me <i>(ak 7071)</i> 1 l/ha Pirmas naudojimas, kai dirva yra labai blogos kokybės ir suslėgta 1,5 - 2 l/ha	plocher augalams do <i>(ap 3051)</i> 20 g/100 kg	plocher augalams do <i>(ap 3051)</i> 200 g/ha plocher specialūs lapai me <i>(ap 3471)</i> 200 ml/ha <i>Esant nepalankioms gamtinėms sąlygoms:</i> plocher kombi-lapai mg <i>(ap 3752)</i> 400 - 600 g/ha	plocher humusinga dirva me <i>(ak 7071)</i> 0,5 l/ha plocher specialūs lapai me <i>(ap 3471)</i> 200 ml/ha	plocher augalams do <i>(ap 3051)</i> 200 g/ha plocher kombi-lapai mg <i>(ap 3752)</i> 200 g/ha <i>Esant nepalankioms gamtinėms sąlygoms:</i> plocher kombi-lapai mg <i>(ap 3752)</i> 400 - 600 g/ha

Atkreipkite dėmesį į šias rekomendacijas:

- purkštuve naudokite plocher agro-kat xl skirtą vandens struktūros atstatymui ir kietumo stabilizavimui:



- Naudojant PLOCHER auginimo technologiją pirmais metais: iki 20 % sumažinkite mineralinių trąšų ir pesticidų kieki.
- Nuolat naudojant PLOCHER auginimo technologijas toliau nuosekliai mažinkite mineralinių trąšų ir pesticidų kiekius.

