

PLOCHER ŠPARAGŲ AUGINIMO TECHNOLOGIJA



Naudojimas	PLOCHER produktai	Kiekis	Pastabos
Pavasari dirvos aktyvinimui	plocher humusinga dirva me plocher specialūs lapai me	1 - 2 l/ha 200 ml/ha	Lauko higiena, aerobinis dirvos biologijos aktyvinimas
Sodinukų apdorojimas	plocher augalams do	500 g/ha Mirkymas tirpale (apie 15000 augalų.)	Pagerina prigijimą Tirpalo santykis 1 g/1l vandens
Dirvos aktyvinimas po derliaus nuėmimo	plocher humusinga dirva me plocher specialūs lapai me	1 - 2 l/ha 200 ml/ha	Palaipsniui mažinkite pesticidus ir mineralinių trąšų kiekį
Augimo metu, kad ilgiau išsilaikytų derlius sandėliuojant	plocher kombi-lapai mg	400 - 600 g/ha	Augalų gyvybingumo palaikymui. Palaipsniui pesticidus ir mineralinių trąšų kiekį
Rudenį paviršiniam kompostavimui	plocher humusinga dirva me	1 - 2 l/ha	Lauko higiena šparagų žolės kompostavimas

Nešiklis:

do - dolomitas, me - melasa, mg – magnio sulfatas.

Priklausomai nuo orų įtakos, vietos ir kt. gali prireikti keisti purškimo seką ir dozę.

Atkreipkite dėmesį į šias rekomendacijas:

- purkštuve naudokite plocher agro-kat xl skirtą vandens struktūros atstatymui ir kietumo stabilizavimui:



- Naudojant PLOCHER auginimo technologiją pirmais metais: iki 20 % sumažinkite mineralinių trąšų ir pesticidų kiekį.
- Nuolat naudojant PLOCHER auginimo technologijas toliau nuosekliai mažinkite mineralinių trąšų ir pesticidų kiekius.

